

Что необходимо знать родителям о педикулёзе???

«Профилактика педикулеза»

В организованных детских коллективах, где дети активно контактируют друг с другом, высок риск распространения такого социально значимого заболевания, как педикулез.

Специалисты муниципального центра диагностики и консультирования предоставляют вашему вниманию рекомендации по профилактике педикулеза у детей и среди их ближайшего окружения, разработанные Институтом гигиены и охраны здоровья детей и подростков Российской Федерации.

Что нужно знать о педикулёзе

Нельзя забывать о вечных спутниках человека - эктопаразитах (то есть паразитах, кормящихся на поверхности организма).

Платяная вошь распространяет сыпной тиф, который во время войн нередко уносил много жизней. В мирное время, когда нет недостатка в воде и мыле, а белье регулярно стирается, этот паразит сохраняется там, где нет необходимых санитарных условий и гигиенических знаний.

Головная вошь встречается в организованных детских коллективах и обнаружение ее у ребенка вряд ли оставит родителей спокойными.

Головная вошь живет на волосистой части головы, питается кровью и откладывает яйца (гниды), прикрепляя их к волосам. Размножение вшей происходит быстрыми темпами. Через 2-3 недели из гнид выходят взрослые насекомые. Места укусов зудят, дети их расчесывают, иногда занося инфекцию.

Родители часто ужасаются и стыдятся, когда обнаруживают у детей головных вшей. Но от вшей просто надо спокойно избавиться!

Народные средства (мытьё головы уксусом или керосином, стрижка головы наголо и пр.) использовать не нужно. В аптеках продаются лекарственные средства от вшей. Средства лучше использовать

современные, отличающиеся нетоксичностью, простотой в применении и надежно избавляющим от вшей и гнид.

Таковыми являются педикулицидные средства линейки **Паранит**. Благодаря им, «бабушкины» средства борьбы с паразитами остались в прошлом, а обработка занимает считанные минут. Данные средства обеспечивают 100% результат после первого применения, действие оказывает в течении 10-15 минут. Подходит для использования не только у школьников, но и их младших братьев и сестер, в том числе в возрасте старше года. Перед процедурой полезно вычесать голову частым гребнем, чтобы удалить взрослых насекомых. Некоторые средства **Паранит** имеют гребень для вычесывания в комплекте.

Педикулез – социально значимое заболевание, поэтому и профилактика педикулеза должна быть социальной. От информированности зависит многое. Знание о специфике заражения вшами – это самая лучшая мера профилактики.

В организованных детских коллективах заражение происходит при непосредственном контакте «голова к голове» во время общения и игр.

При выявлении педикулеза у одного ребенка важно информировать родителей остальных детей и провести осмотр всех детей на педикулез. Важно действовать единым фронтом: осмотр и лечение должны пройти все дети одновременно.